Bijwerkingen bij de medische behandeling van genderdysforie

Puberteitsblokkers vanaf 10-11 jaar

Hersenen
remming geslachtshormonen
puberteit stopt
verstoring hersenontwikkeling,
risico's voor hersenfuncties zoals
effectief plannen, geheugenstoornis
en probleemoplossend vermogen
daling IQ
verhoogde druk in de schedel rond
de hersenen met hoofdpijn en dubbel
of wazig zien

Psychisch
stemmingswisselingen
zenuwachtigheid, angst en depressie
toegenomen risico op zelfmoord



Geslachtsorganen
ontwikkeling stopt
micropenis bij jongens
geen orgasmes, geen seksleven
verschrompeling testikels
vruchtbaarheidsproblemen
vaginaal slijmvlies wordt dunner
en droger
vermindering natuurlijke afweer

Skelet
brozer worden van de botten
(osteoporose), verhoogd risico
op botbreuken
minder snel groeien

Er is geen bewijs dat de genderdysforie vermindert en de psychologische en mentale gezondheid verbeteren: meer dan 90 % gaat door naar cross-seksehormonen, het 'lock-in effect' van puberteitsblokkers

VOORZIJ voor vrouwen
www.voorzij.nl

Cross-seksehormonen, oestrogeen bij jongens vanaf 15 jaar



Hersenen
risico's voor hersenfuncties zoals effectief plannen, geheugenstoornissen en probleemoplossend vermogen
toename van de kans op dementie

Psychisch
angststoornissen, depressie en agressie
Verhoogd sterfterisico, ook door verhoogd risico op zelfmoord
verbetert mentale gezondheid niet

Borst
borstkanker

Lever
cirrose (littekenweefsel in de lever)

Hart en vaatziekten
beroerte
trombose
hartaanval
suikerziekte

Geslachtorganen
libido en seksueel functioneren verminderen sterk
krimpen van de zaadballen, afname sperma
onvruchtbaarheid
zaadbalkanker

Skelet
brozer worden van de botten (osteoporose) hoger risico op botbreuken.

Lichaam
herverdeling van vetmassa
toename gewicht
vrouwelijke overgangsklachten als opvliegers en nachtelijk zweten

Oestrogeen krijgen, betekent niet dat je een menstruatie of maandelijkse cyclus krijgt
Je blijft biologisch een man

Cross-seksehormonen, testosteron bij meisjes vanaf 15 jaar



Huid en stem
vettere huid/ acné
strottenhoofd wordt groter
wat pijnlijk kan worden
lager stemgeluid (onomkeerbaar)
mannelijke kaalheid (onomkeerbaar)

Psychisch/neurologisch
stemmingswisselingen
depressie
verhoogde druk in de schedel rond de hersenen met hoofdpijn en dubbel of wazig zien

Hart en bloedvaten
indikken van het bloed
hoge bloeddruk
verhoogd risico op suikerziekte
daling van het gunstige HDL-cholesterol-risico op trombose,
beroerte en hartaanval (2-4 x verhoogd)

Lever/nieren
ontsteking van de lever (geelzucht)
cirrose (uitgebreid littekenweefsel in de lever), komt 2 x zo vaak voor
nierschade

Lichaam
herverdeling van vetmassa
toename gewicht

Geslachtsorganen/urinewegen
clitorisvergroting, pijnlijk
vaginaal slijmvlies wordt dunner en droger, branderigheid, jeuk
bloedverlies, ontstekingen en pijn bij seks
bekkenbodemproblemen zoals urine-incontinente
urineweginfecties constipatie of fecale incontinentie
schade aan eicellen, risico op onvruchtbaarheid

Zwangerschap
clitorale hypertrofie, samengesmolten of gedeeltelijk samengesmolten schaamlippen en mogelijk een afwezige vagina bij vrouwelijke foetus
Testosteron is gecontra-indiceerd bij zwangeren

Transgenders hebben een aanzienlijk hoger overlijdensrisico en vertonen vaker suïcidaal gedrag en hebben vaker psychiatrische problemen dan de algemene bevolking
Kinderen die een puberteitsblokker gaan gebruiken in het begin van de puberteit en daarna doorgaan met cross-seksehormonen worden waarschijnlijk onvruchtbaar

Operaties
vanaf 18 jaar

Jongens

Psychisch
3-6 keer meer psychische hulp nodig
·depressie
·angststoornissen
tot 12-voudig verhoogd risico op een zelfmoordpoging

Borstkas
borstimplantaten
risico op verspreiding implantaatmateriaal door het lichaam

Geslachtsorganen
Vaginaplastiek: kunstmatige holte uit scrotum/darm die iedere dag verwijd moet worden
genitale fistels
urine incontinentie
seksueel disfunctioneren
onvruchtbaarheid

Meisjes

Psychisch
3-6 keer meer psychische hulp nodig
·depressie
·angststoornissen
tot 12-voudig verhoogd risico op een zelfmoordpoging

Borstkas
borstamputatie (vanaf 15 jaar)
borstvoeding geven is onmogelijk

Geslachtsorganen
Phalloplastiek: kunstpenis uit bijv. weefsel en huid van onderarm
ontsteking/irritatie/vernauwing plasbuis
urine-incontinentie
verzakking van bekkenorganen
seksueel disfunctioneren
onvruchtbaarheid



Het doorlopen van de normale puberteit, aangevuld met adequate psychosociale ondersteuning en psychotherapie, leidt in het overgrote deel van de gevallen dat jongeren 'eroverheen groeien'
Dat betekent de (complete) afname van gendertwijfel en het lijden dat daaruit voortkomt